

AM2520-H: Geschiedenis

week 3.6, Vrijdag

K. P. Hart

Faculteit EWI
TU Delft

Delft, 20 maart, 2020

Outline

1 Newton

2 Leibniz

Machtreeksen

Newton vond machtreeksen ('oneindig lange polynomen') net zo natuurlijk als decimale ontwikkelingen.

Hij trok de analogie van polynomen en decimale getallen gewoon door.

Bijvoorbeeld:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots$$

door middel van een staartdeling.

Machtreeksen

Of

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{16} - \frac{5x^8}{128} + \frac{7x^{10}}{256} - \dots$$

door middel van 'worteltrekken met de hand' (zie 18 februari).

Machtreeksen

Of vergelijkingen oplossen. Zeg $y^3 - 2y - 5 = 0$.

Dan is 2 bijna een oplossing; neem dus $y = 2 + p$ en vul in: $p^3 + 6p^2 + 10p - 1 = 0$.

Negeer hogere machten en los $10p - 1 = 0$ op.

De tweede benadering is 2.1, en we gaat verder met $p = 0.1 + q \dots$

Dit werkt ook met iets als $y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = 0$. Stug doorwerken geeft

$$y = a - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{64a} + \frac{131x^3}{512a^2} + \frac{509x^4}{16384a^3} + \dots$$

De binomiaalformule

Newton probeerde de oppervlakte van een kwart cirkel te bepalen, dus onder de grafiek van $(1 - x^2)^{\frac{1}{2}}$.

Hij begon met $(1 - x^2)^n$ voor natuurlijke getallen n en primitiveerde in feite. In onze taal:

De binomiaalformule

$$\int_0^x (1 - x^2)^0 dx = x$$

$$\int_0^x (1 - x^2)^1 dx = x - \frac{1}{3}x^3$$

$$\int_0^x (1 - x^2)^2 dx = x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$$

$$\int_0^x (1 - x^2)^3 dx = x - \frac{3}{3}x^3 + \frac{3}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7$$

$$\int_0^x (1 - x^2)^4 dx = x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{6}{5}x^5 - \frac{4}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9$$

De binomiaalformule

De coëfficiënten van x , $-\frac{1}{3}x^3$, $\frac{1}{5}x^5$, $-\frac{1}{7}x^7$, $\frac{1}{9}x^9$... volgen de driehoek van Pascal.

Dus zal dat voor $n = \frac{1}{2}$ ook wel zo zijn ...

De coëfficiënten worden dan

$$\binom{\frac{1}{2}}{0} = 1, \quad \binom{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{8}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{3} = \frac{3}{48}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{4} = -\frac{15}{384},$$

Algemeen

$$\binom{\frac{1}{2}}{k} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - k + 1)}{k \cdot (k - 1) \cdots 1}$$

De binomiaalformule

Dit werkt voor alle exponenten en de noemers 1, 3, 5, 7, ... kwamen alleen wegens de oppervlakteberekening tevoorschijn.

En dus

$$(a + bx)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} bx + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 x^2 + \binom{n}{3} a^{n-3} b^3 x^3 + \dots$$

de *algemene binomiaalformule*.

Waarom niet meteen van het begin $(1 - x^2)^{\frac{1}{2}}$ zo gedaan?

De binomiaalformule

Newton vond dat dit klopte want het gaf in veel gevallen het antwoord dat hij op andere manieren had gevonden: voor $n = -1$ krijg je ook


$$(1 + x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots$$

En dus(!)

$$\log(1 + x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{6}x^6 + \dots$$

Geen opmerkingen over convergentie.

Terug naar de cirkel



De oppervlakte van de sector: $\frac{1}{2}y = \frac{1}{2} \arcsin x$

De oppervlakte van driehoek: $\frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2}$

Dus

$$\begin{aligned}
 y &= \arcsin x \\
 &= 2 \int_0^x (1-x^2)^{\frac{1}{2}} dx - x(1-x^2)^{\frac{1}{2}} \\
 &= x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \dots
 \end{aligned}$$

via de reeks voor $(1-x^2)^{\frac{1}{2}}$.

Terug naar de cirkel

En nu oplossen naar x geeft, natuurlijk, $x = \sin y$.


Op de eerdere manier van stuksgewijs de vergelijking

$$y = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \dots$$

oplossen geeft

$$x = y - \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{120}y^5 - \frac{1}{5040}y^7 + \dots$$

De hoofdstelling van de Integraalrekening



De beweging van het punt (x, y) bepaalt de kromme

De beweging van de verticale lijn bepaalt de oppervlakte z

Dus is zonder meer(!) duidelijk dat

$$\dot{z} = y \cdot \dot{x}$$

ofwel

$$\frac{\dot{z}}{\dot{x}} = y$$

Nog veel meer

- 1 Primitiveren gebeurde voornamelijk door termsgewijs integreren van machtreeksen.
- 2 Impliciet differentiëren, bijvoorbeeld als $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$ dan $\dot{x} : \dot{y} = (3y^2 - ax) : (3x^2 - 2ax + ay)$
- 3 Wetten van Kepler; “ik heb het al uitgerekend” zei Newton tegen Halley, die daar vragen over had.

Sommen en verschillen

Een handige opmerking.

Als A, B, C, D, E een stijgende rij getallen is en L, M, N, P de rij verschillen ($L = B - A$, etc) dan geldt

$$L + M + N + P = E - A$$

Dit is handiger dan je zou denken

Sommen en verschillen

De Aritmetische driehoek (van Pascal).

1									
1	1								
1	2	1							
1	3	3	1						
1	4	6	4	1					
1	5	10	10	5	1				
1	6	15	20	15	6	1			
1	7	21	35	35	21	7	1		
1	8	28	56	70	56	28	8	1	

Elke kolom is de verschilrij van de kolom
rechts ernaast

$$\text{Dus } 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

(tweede en derde kolom)

$$\text{en } 3 + 6 + 10 + 15 = 35 - 1 = 34$$

(derde en vierde kolom)

Sommen en verschillen

De Harmonische driehoek (van Leibniz).

$\frac{1}{1}$									
$\frac{1}{2}$									
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$								
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{20}$						
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{30}$					
$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{42}$	$\frac{1}{105}$	$\frac{1}{140}$	$\frac{1}{105}$	$\frac{1}{42}$				
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{56}$	$\frac{1}{168}$	$\frac{1}{280}$	$\frac{1}{280}$	$\frac{1}{168}$	$\frac{1}{56}$			
$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{72}$	$\frac{1}{252}$	$\frac{1}{504}$	$\frac{1}{630}$	$\frac{1}{504}$	$\frac{1}{252}$	$\frac{1}{72}$		$\frac{1}{9}$

Elke kolom is de verschilrij van de kolom **links** ernaast

Dus $\frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{30} = \frac{1}{2} - \frac{1}{20}$
(tweede en derde kolom)

Maar dit geldt ook voor oneindig lange sommen (wat je aftrekt gaat naar nul), dus:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{30} + \dots = \frac{1}{2}.$$

Sommen en verschillen

Leibniz vertaalde dit naar de meetkunde van krommen.

Stel $y = f(x)$ op een interval $[a, b]$. Neem een partitie $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ van $[a, b]$, met bijbehorende ordinaten y_0, y_1, \dots, y_n .

De verschilrij $\langle \delta y_i \rangle$ heeft als som $y_n - y_0$.

De verschilrij van de rij $\langle \sum y_i \rangle$ (met $\sum y_i = y_0 + \dots + y_i$) is de rij $\langle y_i \rangle$ zelf:

$$\left\langle \delta \sum y_i \right\rangle = \langle y_i \rangle$$

Sommen en verschillen

De kromme is een veelhoek met oneindig veel zijden met bij elk snijpunt een waarde van x en y .

De verschilrij noteren we met dy en de somrij als $\int y$.

We krijgen dus als eerder $\int dy = y$ en $d \int y = y$.

De eerste is duidelijk: de som van de *differentialen* (verschillen) over een interval is het verschil over het interval.

Het tweede heeft geen duidelijke meetkundige interpretatie; die som van oneindig veel dingen kan best oneindig zijn.

Sommen en verschillen

Leibniz bekeek daarom $y \, dx$, de infinitesimale oppervlakte onder zo'n oneindig kleine zijde van de veelhoek.

De regel $d \int y \, dx = y \, dx$ zegt in dit geval dat de $y \, dx$ de verschilrij vormen van de rij oppervlakten onder de veelhoek (de kromme).


(De hoofdstelling van de integraalrekening is dus ook bij Leibniz meteen duidelijk!)

Leibniz dacht lang na over de notatie, de d staat voor *differentia*

En de \int (een uitgerekte S) staat voor *summa*

Een oud probleem

Leibniz loste een oud probleem op: geef de kromme waarvan de subtangent constant is, met waarde a .



In het plaatje is τ de raaklijn (tangent) en t is de *subtangent*: het verschil tussen x en het snijpunt van τ met de x -as.

De vraag is dus: voor welke kromme is t constant, met waarde a ?

Er moet dus gelden dat $y : a = dy : dx, \dots$

Een oud probleem

... en hieruit halen we een differentiaalvergelijking: $a dy = y dx$.

Hou nu dx constant, de y zijn dus evenredig met hun verschillen dy .

Dat betekent dat de y een 'meetkundige rij' vormen.

De x vormen een rekenkundige rij, dus het verband tussen y en x is logaritmisch.

De kromme is dus een logaritmische kromme.

Een oud probleem


Wij zouden zeggen dat de kromme exponentieel is, immers de oplossing van de differentiaalvergelijking is

$$y = C \exp(ax)$$

Maar als je die spiegelt in de lijn $y = x$ krijg je de grafiek van een logaritme.

Logaritmisch, exponentieel, dat is hetzelfde . . .

Nog een differentiaalvergelijking



We hebben (als bij Newton)
 $y = \arcsin x$, of $x = \sin y$.
 Gelijkvormige driehoeken:

$$dt = \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

Stelling van Pythagoras:

$$dt^2 + dx^2 = dy^2$$

NB eigenlijk $(dt)^2 + (dx)^2 = (dy)^2$.

Nog een differentiaalvergelijking

Invullen en uitwerken:

$$dx^2 + x^2 dy^2 = dy^2$$

Hou dy constant (eenparig langs de cirkel dus) en pas d toe:

$$2 dx \cdot d dx + 2x dx \cdot dy^2 = 0 \text{ en dus}$$

$$d^2x + x dy^2 = 0 \quad \text{ofwel} \quad \frac{d^2x}{dy^2} = -x$$

Hier komt de notatie met d^2 en dy^2 vandaan!

Nog een differentiaalvergelijking

Leibniz vond hiermee ook de machtreeks voor de sinus

$$x = ay + by^3 + cy^5 + dy^7 + \dots$$

en

$$\frac{d^2x}{dy^2} = 3 \cdot 2 \cdot by + 5 \cdot 4 \cdot cy^3 + 7 \cdot 6 \cdot dy^5 + \dots$$

Gelijkstellen van $-x$ en $\frac{d^2x}{dy^2}$ geeft dan:

$$-a = 3 \cdot 2 \cdot b, \quad -b = 5 \cdot 4 \cdot c, \quad -c = 7 \cdot 6 \cdot d, \dots$$

Begin met $a = 1$ en ...

Vergelijking

Wat Newton en Leibniz deden was de Calculus algemeen ontwikkelen.

Er was verschil in opvatting/aanpak; Newton dacht meer in termen van beweging en dat is te zien aan de terminologie: 'fluxions' en 'fluents'.

Leibniz dacht wat meer algebraïsch.

De grote plus die Leibniz van velen kreeg is voor zijn notatie. Die maakte het werken een stuk makkelijker.

Door de ruzie over prioriteit keerden de Engelse wiskundigen zich van de 'Europese' Calculus af, en ze begonnen hopeloos achter te lopen.